


Verwijderen Allergielabel

SITUATIES

Een allergielabel kan direct verwijderd worden in de volgende situaties:

- Het antibioticum is gebruikt sinds de indexreactie zonder dat er een allergische reactie heeft plaatsgevonden.
- Het allergielabel was uitsluitend gebaseerd op een familiegeschiedenis van allergie of op angst voor allergie.
- De symptomen zijn niet compatibel met een allergische reactie (o.a. alleen maag-darmklachten, hartkloppingen, wazig zicht).
- Er was geen tijdsverband tussen blootstelling aan het antibioticum en het optreden van symptomen.
- De indexreactie was niet ernstig, beperkt tot de huid en vond plaats op kindertijd én > 10 jaar geleden.
- De patiënt is zich niet bewust van het label en kan zich geen allergische reactie herinneren.




Allergie-anamnese

EVALUATIE EN BELEID

Vragen bij een vermoeden op antibiotica-allergie

Om welk antibioticum ging het?	Vraag ook naar het specifieke antibioticum. Bijvoorbeeld bij een penicilline allergie: om welk penicilline ging het? Patiënten kunnen bijvoorbeeld allergisch zijn voor amoxicilline, of voor de gehele penicillinegroep.
Wanneer vond de reactie plaats?	Een allergie kan met de jaren verdwijnen. Hoe langer geleden de reactie plaats vond, des te kleiner is de kans dat de reactie na re-expositie opnieuw zal optreden.
Hoe snel traden de symptomen op?	‘Immediate type’ reacties ontstaan meestal binnen een uur na toediening, maar in ieder geval binnen 6 uur. ‘Delayed type’ reacties treden doorgaans na >24 uur op.
Hoe lang hielden de symptomen aan?	‘Immediate type’ reacties verdwijnen vaak binnen minuten/uren na staken. ‘Delayed type’ reacties kunnen dagen tot weken aanhouden.
Wat hielden de symptomen in?	O.a. urticaria, angio-oedeem, stridor en collaps wijzen op een ‘immediate type’ reactie. Een exantheem wijst op een ‘delayed type’ reactie.
Zijn de klachten geobjectiveerd door een zorgprofessional of zijn er fotos?	Geregistreerde observaties kunnen waardevolle informatie bevatten over het type reactie. Foto’s van het huidbeeld kunnen helpen met het onderscheid tussen een exantheem en urticaria.
Voor welke ziekte werd het antibioticum voorgeschreven?	Vaak worden de symptomen van de ziekte verward met een allergische reactie. Bijvoorbeeld een exantheem bij een virale infectie, kan worden aangezien voor een allergie.
Had de reactie ziekenhuisopname en/of gebruik van adrenaline tot gevolg?	Noodzaak tot adrenaline toediening wijst op een ‘immediate type’ reactie. Ook ‘delayed type’ reacties kunnen in zeldzame gevallen ernstig verlopen. Daarnaast is dit van belang voor het inschatten van de ernst van de reactie.
Is het betreffende antibioticum ooit opnieuw gebruikt?	Het komt voor dat het antibioticum (al dan niet accidenteel) toch gegeven is. Indien hierna geen reactie optrad kan het toegediende middel (weer) als veilig worden beschouwd.
Is er na deze reactie ooit op antibiotica allergie getest?	Met huid- en/of provocatietesten kunnen antibiotica allergieën betrouwbaar worden aangetoond danwel uitgesloten.



Meer informatie? Bekijk onze website
 of neem contact op
 via info@zorgnetwerkenamr.nl



W www.zorgnetwerkenamr.nl
 E info@zorgnetwerkenamr.nl



* Toxische epidermale necrolyse

Voor meer informatie zie volledige richtlijn antibiotica allergie op www.swab.nl

Toelichting flowchart

Het advies ten aanzien van toekomstig gebruik van het antibioticum hangt af van drie factoren: het type reactie ('immediate' of 'delayed'), de ernst van de reactie (mild of ernstig) en hoe lang geleden de reactie was. Voor het type reactie zijn de symptomen en het tijdsbeloop van belang. De ernst van de reactie wordt bepaald op basis van de symptomen (bijvoorbeeld stridor) en de gevolgen van de reactie (bijvoorbeeld ziekenhuisopname).

Kruisallergie

Kruisallergie tussen penicillines en de cefalosporines is zeer zeldzaam, omdat de ziekten van de meeste cefalosporines die we in Nederland gebruiken niet lijken op de ziekten van de penicillines. Bekijk voor meer informatie de 'tabel: risico op kruisallergie' en andere antibiotica-allergie producten op amrhollandwest.nl/kennis/just-gebruik-van-antibiotica/antibiotica-allergie, of scan de QR-code.

